

花蓮、宜蘭縣地區 102 年 01 月份作物病蟲害疫情發生預測

102.01.02

| 作物別 | 發生病蟲害及有害動物 | 發 生 地 區 | 預 測 發 生 原 因 | 防 治 要 點 |
|-----|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番茄 | 晚疫病 | 花蓮縣吉安、壽豐、玉里、富里(全月·輕-中) 宜蘭縣礁溪、壯圍、宜蘭市、員山、五結、羅東(下旬·輕-中) | 一月份預期鋒面來時，降雨機率大，適合發病蔓延。 | 1.以遮雨設施防降雨。 2.選用達滅芬、亞托敏、氫氧化銅、賽座滅等藥劑噴施。 3.合理施肥，增加磷鉀肥和微量元素，避免偏施氮肥。 4.雨季來臨前參考使用亞磷酸，可誘導防病。 |
| 韭菜 | 銹病 | 吉安鄉(全月·輕度) | 近期氣溫適合銹病之發生與蔓延。 | 1.勿過度密植，以保持通風。 2.可選用亞托敏等或青蔥選用三泰隆或三氟敏。 3.韭菜可選用百克敏或菲克利等藥劑噴施。 |
| 葉菜類 | 小菜蛾 | 花蓮、宜蘭縣各鄉鎮(全月) | 1.近期氣候適合小菜蛾、紋白蝶及各類蚜蟲類繁殖及蔓延。 2.配合休耕所種植之油菜已生長，部份早植者害蟲逐漸為害。 | 1.蟲害發生時以因得克或因滅汀等藥劑擇一使用。 2.非農藥防治可選用以蘇力菌、黑殭菌或核多角體病毒。 |
| | 紋白蝶 | | | 1.選用蘇力菌、因滅汀或傑他賽滅寧等藥劑。 |
| | 蚜蟲類 | | | 1.清除園區附近雜草。 2.選用畢芬寧、益達胺等藥劑。 |
| | 黃條葉蚤 | 同上 | 目前為葉菜類生育盛季，該蟲均會發生危害。 | 1.連作時應於種植前浸水淹埋，以消滅土壤內殘存害蟲。 2.整地後至收穫前，田間置放黃色粘紙誘殺成蟲。 3.選用美文松、培丹、佈飛松、阿巴汀等藥劑防治。 4.非農藥防治可採用 50 倍菸草浸出液防治。 |
| | 斜紋夜蛾 | 同上 | 同上 | 1.種植前全園浸水，以殺死土壤中之蛹。 2.採用性費洛蒙誘殺雄性成蟲。 3.藥劑防治可選用賽洛寧或美文松。 |
| 青蔥 | 紫斑病 | 下旬(輕) | 發現有該病徵時即施藥防治 | 1.藥劑防治可選用克收欣、亞托敏、依普同。 |

| | | | |
|------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 菌核病 | 下旬(輕・中) | 發現有該病徵時或寒冷天氣時注意防治。 | 1.秋冬季來臨時(10月下旬)，北部易發病地區如遇下雨，即應注意青蔥田間狀況，發現病徵出現時即應開始防治，如使用之殺菌劑屬可濕性粉劑時應添加展著劑以助藥劑之附著力。 2.病葉應隨時清除，並予以深埋勿使其在田間產生菌核，以減少第二次感染源。 3.勿連作，夏季時田間灌水，浸水至少二周，可使田間土壤中殘存之菌核死亡，減少秋冬季之感染機率。 4.可參考選擇使用大克爛、撲滅寧、貝芬同、福多寧、保粒黴素(甲)輪流防治。 |
| 疫 痘 | 各鄉鎮 (全月・中-重度) | 因鋒面及東北季風影響，降雨機率增加，可促進蔓延。 | 1.蔥種種植前先行浸種消毒，陰乾後再種植。 2.選擇種植排水良好地區，高畦深溝整地，雨水期可及時排水降低田間濕度。 3.合理施肥，增加磷鉀肥和微量元素，避免偏施氮肥。 4.施用草木灰也有利於提高抗病力。 5.雨季來臨前參考使用亞磷酸，可誘導防病。 6.可參考選擇亞托敏、三元硫酸銅、嘉賜銅、四氯異苯腈、福賽得等藥劑輪流使用。 |
| 蔥薊馬 | 全月(輕) | 目前該蟲已陸續發生，希加強防範。 | 1.田間置放藍色粘紙誘殺成蟲。 2.青蔥選用乃力松、納乃得、賽達松等藥劑。 3.韭菜選用賽達松、培丹、乃力松等藥劑。 4.非農藥防治可參考施用印楝素、苦楝油、菸草浸液。 |
| 蔥潛蠅 | 全月(輕) | 氣溫升高時該蟲適宜發生為害。 | 1.種植前全園浸水，以殺死土壤中之蛹。 2.田間置放黃色粘紙誘殺成蟲。 3.種植前選用二硫松、福瑞松等藥劑。 |
| 甜菜夜蛾 | 全月(輕) | 青蔥有發現該蟲零星為害，應加強防治。 | 1.終年懸掛性費洛蒙。 2.藥劑防治可選用因滅汀、得芬諾、蘇力菌等藥劑。 3.參考選用黑殭菌或核多角體病毒防治。 |

※1.推薦藥劑的使用濃度，請詳閱農藥瓶標示；其他推薦藥劑，請上防檢局農藥資訊服務網(<http://pesticide.baphiq.gov.tw>)查詢，或洽本場植物保護研究室。聯絡電話：03-8535915；傳真：03-8533740。

2.相關資訊亦可上本場網站查詢(<http://www.hdais.gov.tw>)。