

芋	斜紋夜蛾	吉安鄉（其他地區亦請注意） (全月·輕-中)	世代發生蟲期，天候炎熱乾燥，適合孳生繁衍，將可受其為害。	1.採用性費洛蒙緩釋劑誘殺雄性成蟲。 2.初齡幼蟲出現時，於傍晚噴施賽洛寧。田埂、溝壁亦應同時施藥。
青蔥、韭菜	蔥薊馬	各鄉鎮 (全月·輕)	目前該蟲已陸續發生，希加強防範。	1.清除園區附近雜草、林木等減少棲息場所。 2.田間置放藍色粘紙誘殺成蟲。 3.選用益達胺、賽洛寧等藥劑。 4.參考施用印楝素、苦楝油、菸草浸液等非農藥防治資材。
青蔥	蔥潛蠅	各鄉鎮 (全月·輕)	氣溫升高時該蟲適宜發生為害。	1.種植前全園浸水，以殺死土壤中之蛹。 2.種植前選用福瑞松等藥劑。 3.田間置放黃色粘紙誘殺成蟲。
	甜菜夜蛾	各鄉鎮(全月·中-重)	青蔥有發現該蟲零星為害，應加強防治。	1.終年懸掛性費洛蒙誘蟲盒。 2.參考選用黑殭菌或核多角體病毒防治。 3.選用因滅汀、剋安勃、蘇力菌等藥劑
青蔥、葉菜類	軟腐病	各鄉鎮(全月·輕-中)	夏季高溫經常下西北雨時，適宜該病發生，應加強防治	1.病害發生時以鏈黴素噴施於植株基部。 2.儘量築高畦，避免密植，以保持良好通風及排水，並同時防除地上及地下害蟲之傷害。
	斜紋夜蛾	各鄉鎮(全月·中-重)	六月份田間密度已增高，應加強防治。	1.種植前全園浸水，以殺死土壤中之蛹。 2.採用性費洛蒙誘殺雄性成蟲。 3.選用賽洛寧藥劑防治。
葉菜類	十字花科黃條葉蚤	同上	同上	1.連作時應於種植前浸水淹埋，以消滅土壤內殘存害蟲。 2.整地後至收穫前，田間置放黃色粘紙誘殺成蟲。 3.選用達特南、培丹、佈飛松、阿巴汀等藥劑防治。

				4.採用菸草浸出液防治之。
蔬菜、瓜果	銀葉粉蝨	各鄉鎮 (全月·中-重)	六月份田間蟲源存在，七月份天候炎熱乾燥，適合孳生繁衍，各類蔬菜、瓜果作物將可受其棲生為害。	1.清除園區附近雜草、林木等減少棲息場所。 2.參考選用畢芬寧、阿巴汀、益達胺等藥劑噴施，並配合懸掛黃色粘板施藥。
瓜果	瓜實蠅	各鄉鎮 (全月·中-重)	4~9月為瓜實蠅發生密度高峰期應注意防治	1.收穫後儘速處理殘株及果實，並整地以防成蟲產卵或老熟幼蟲於土中化蛹。 2.瓜類生育及開花結果期懸掛克蠅香誘殺器及黃色黏板。 3.開花結果後施用馬拉松添加蛋白質水解物。
番茄	細菌性斑點病	蔬菜栽培區 (全月·輕-中)	同上	1.保持田間衛生 2.選用嘉賜銅、氫氧化銅。
果樹	東方果實蠅	各鄉鎮 (全月·輕-中)	六月份密度增加迅速，近期氣候高溫乾燥，果實蠅世代時間縮短。	1.全面懸掛含毒甲基丁香油及黃色黏板，以減少被害。 2.清除落果，減少孳生源。 3.密度增加迅速時，以蛋白質水解物加芬殺松點狀噴施園區外。 4.參考使用藥劑防除，柑桔園(芬化利、芬殺松)、蓮霧園(賽扶寧)、檬果園(芬殺松)。

※1.其他推薦藥劑，請詳閱農藥瓶標或上防檢局農藥資訊服務網 <http://pesticide.baphiq.gov.tw> 查詢，或洽本場植保研究室。電話：

03-8535915·傳真 03-8533740 查詢。

2.相關資訊亦可上本場網站查詢 <http://hdais.coa.gov.tw>

行政院農業委員會花蓮區農業改良場 印發