

一、氯酸鈉

600 G/L (60% W/V) 氯酸鈉 SL

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期	注意事 項	說明	原始登記 廠商名稱
紅豆	植株乾燥 處理	22.5 公升	50	紅豆全株達80%以上淡褐色乾 枯之完熟期，於採收前7天 全株均勻噴施1次。				7			貝士得開 發企業有 限公司

併同刪除現行 52% 氯酸鈉 SL 之使用範圍及廢止其許可證。

二、小菜蛾性費洛蒙

90.500% 小菜蛾性費洛蒙 VP

作物名稱	病蟲 名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期	注意 事項	說明	原始登記 廠商名稱
果樹、花木、特用、 麥類、雜糧類、乾豆 類、包葉菜類、小葉 菜類、根菜類、果菜 類、瓜菜類、瓜果 類、豆菜類、	小菜蛾	每公頃誘 餌數量 120 個					每 8-12 公尺設置 1 個性費洛蒙 誘蟲器，每橡皮帽內含費洛蒙 0.45 毫克；將誘餌放置於黏膠 式誘蟲器內，黏板黏滿小菜蛾 蟲體時需及時更換；誘蟲盒懸 掛高度為作物生長點上方 30-50 公分處。			延伸使用	

三、甜菜夜蛾費洛蒙

80. 200%甜菜夜蛾費洛蒙 VP

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時 期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
果樹、花木、特用、 麥類、雜糧類、乾豆 類、包葉菜類、小葉 菜類、根菜類、果菜 類、瓜菜類、瓜果 類、豆菜類、	甜菜夜蛾	設置 11-18 個 點							1. 不宜同時將兩種不同性費洛 蒙置於同一個誘蟲盒內。 2. 誘蟲盒至少每週清 1 次。	延伸使用	

87. 200%甜菜夜蛾費洛蒙 VP

作物名稱	病蟲名稱	每公頃 每次用量	稀釋 倍數	使用時期	施藥 間隔	施藥 次數	施藥 方法	安全採 收期	注意事項	說明	原始登記 廠商名稱
果樹、花木、特用、 麥類、雜糧類、乾豆 類、包葉菜類、小葉 菜類、根菜類、果菜 類、瓜菜類、瓜果 類、豆菜類、	甜菜夜蛾	500 條		甜菜夜蛾 發生前至 發生初期 使用。			設置高度離 地面約 60 公 分，並均勻分 布於田間，設 置間距約 5 公尺。		1. 具交配干擾功能。 2. 不用時須以鋁箔紙密封， 儲放於冷凍庫內。 3. 田區面積 1 分地以上適 用，大面積共同防治效果 更佳。 4. 施用後藥效可持續 3 個月。 5. 每條含有效成分 0.24 公 克。	延伸 使用	