

## 6個月至5歲幼兒莫德納 COVID-19疫苗接種建議

- 建議經醫師評估後6個月至5歲幼童接種莫德納COVID-19疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡之風險
- 經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議**接種兩劑基礎劑**，**每劑須接種0.25ml (含25 $\mu$ g mRNA)**，兩劑間隔4-8週以上
- 接種部位，原則建議未滿2歲之嬰幼童接種大腿前外側股外側肌，2歲以上幼童接種非慣用手之上臂三角肌
- 感染COVID-19後短期內再次感染的風險可能會降低，確診者建議自發病日或確診日(無症狀感染者)起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗

2022/06/29

中央流行疫情指揮中心

## 6個月至5歲幼兒莫德納COVID-19疫苗接種後注意事項

- 接種後可透過接種單位提供的QR code掃描加入Taiwan V-Watch疫苗接種-健康回報，協助家長關注子女接種後狀況，提升對COVID-19疫苗安全性監測、相關關懷照護及因應效率
- 接種後可能發生之常見副作用，如**躁動/哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位紅斑及腫脹**等，如發燒超過48小時、嚴重過敏反應如**呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹**等不適症狀，**應儘速就醫釐清病因**

2022/06/29

中央流行疫情指揮中心

# 兒童接種mRNA疫苗後應注意的心肌炎/心包膜炎

## · 什麼是心肌炎/心包膜炎？

心肌炎是指心臟肌肉發炎，心包膜炎是包圍心臟周圍的纖維組織發炎。這兩個情況可以單獨或同時發生(心肌心包膜炎)。

## · 依據疫苗上市後安全性監測資料，接種mRNA疫苗後曾出現極罕見的心肌炎和心包膜炎病例。

- 主要發生在接種後14天內(極少數個案發生於接種後2-4週間)
- 較常發生在接種第二劑之後以及年輕男性。
- 評估後mRNA疫苗用於年輕族群的整體臨床效益仍大於其風險。

## · 接種疫苗後28天內如出現疑似心肌炎/心包膜炎症狀，應立即就醫：

- 胸痛、胸口壓迫感或不適症狀
- 心悸(心跳不規則、跳拍或顫動)
- 運動耐受不良(如走幾步路就很喘、沒有力氣爬樓梯)
- 暈厥(昏厥)
- 呼吸急促

2022/06/29

中央流行疫情指揮中心

# 18歲以下COVID-19疫苗接種說明

發布日期：  
2022年7月7日

對象	第一劑	第二劑		第三劑(追加劑1)	
	種類	種類	與前一劑間隔	種類	與前一劑間隔
6個月至5歲 (未滿6歲)	莫德納 (小兒劑型0.25ML) 7月22日起開始施打 家長逕洽醫院、診所預約	與前一劑同	4-8週以上	-	-
5-11歲	BNT (兒童劑型0.2ML)			-	-
6-11歲	莫德納 (兒童劑型0.5ML) 莫德納 (成人劑型0.25ML)			-	-
12-17歲	BNT (成人劑型0.3ML) 莫德納 (成人劑型0.5ML)	BNT 莫德納	12週 (84天)	BNT	5個月 (150天)

註:第一劑未滿12歲(兒童劑量)，第二劑滿12歲足歲(成人劑量)需間隔4-8週；  
第一劑12歲足歲(成人劑量)，第二劑12歲需間隔12週(成人劑量)

※若有相關疑慮 請電洽 宜蘭縣政府1999為民服務專線・宜蘭縣政府衛生局防疫專線(03)9357011

宜蘭縣政府  
Yilan County Government