

## 番荔枝銹病緊急防治藥劑

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
10%亞托敏 水懸劑	1-2 公升	800	病害發生初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次。	採收前 12 天停止施藥。
23%亞托敏 水懸劑	0.4-0.8 公升	2,000		
250g/L (25% w/v) 亞托敏水懸劑	0.4-0.8 公升	2,000		
50%亞托敏 水分散性粒劑	0.2-0.4 公斤	4,000		
50%三氟敏 水分散性粒劑	0.2-0.4 公斤	4,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次。	採收前 18 天停止施藥。
43.7%三氟敏 水懸劑	0.2-0.4 公升	4,000		
500g/L (50% w/v) 三氟敏水懸劑	0.2-0.4 公升	4,000		
23.6%百克敏 乳劑	0.2-0.5 公升	3,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次。	採收前 12 天停止施藥。
25.9%得克利 水基乳劑	0.5-1 公升	1,500	病害發生初期開始施藥，必要時隔 7 天施藥 1 次。	採收前 6 天停止施藥。
250g/L (25% w/v) 得克利水基乳劑	0.5-1 公升	1,500		